

Cómo aplicar una crema o ungüento rectal apropiadamente para aplicar un anestésico rectal al área alrededor del recto:

- En primer lugar, limpie el área, utilizando jabón suave y agua o un trapo de limpieza. Enjuague el área cuidadosamente y séquela suavemente con una toalla suave o papel higiénico.
- Aplique una pequeña cantidad de medicamento en la zona dolorida, usando un trozo de gasa, un pañuelo de papel o una "cuna para los dedos".

Para insertar una crema o ungüento rectal dentro del recto:

- Use solamente productos que vienen envasados en aplicadores pre-llenados o que vienen empaquetados con un inserto especial llamado tubo rectal.

Si usted está usando un producto que tiene un insertador (tubo rectal) empaquetado por separado del tubo de la crema o del ungüento:

- Retire la tapa del tubo de crema o ungüento. Fije el insertador a la parte superior del tubo. Apriete el tubo hasta que salga un poco de crema o pomada en el inserto. A continuación, Esparza la crema o el ungüento sobre el inserto.
- Coloque el inserto en el recto y apriete el tubo hasta que salga una pequeña cantidad de medicamento. Luego retire el inserto de su cuerpo.
- Retire el inserto del tubo y vuelva a colocar el tapón. Luego Lave cuidadosamente el aplicador.

Si está utilizando el producto que viene en aplicadores pre-llenados:

- Siga las instrucciones para usar el aplicador e insertar el medicamento. Cada aplicador está destinado a ser utilizado sólo una vez. Tire el aplicador lejos después de usarlo.

Para insertar la espuma de aerosol rectal en el recto:

- No introduzca el recipiente en su recto. Utilice el aplicador suministrado.
- Para llenar el recipiente — primero, agite el recipiente duramente durante varios segundos. Luego, sosteniendo el recipiente en posición vertical, insértelo en el aplicador. Presione la tapa del recipiente hasta que la espuma llegue a la línea de llenado del aplicador. Retire el aplicador del recipiente.
- Para usar el medicamento — Coloque una pequeña cantidad de espuma en la punta del aplicador. Inserte el aplicador en el recto, luego empuje el émbolo lo más lejos posible. Retire el aplicador. Luego desarmarlo y lavarlo con cuidado.

Recordar

- Siga las instrucciones cuidadosamente
- No se pierda dosis
- Almacene la medicación como se indica en la etiqueta auxiliar en el paquete



- Almacene los medicamentos fuera del alcance de los niños

